

## *Mycena amicta* (Fr:Fr) Quelet

### MACRO

Sombrero entre 1 y 1,5 cm, de cónico acampanado a hemisférico, ligeramente umbonado y con margen coloreado. Cutícula lisa, gelatinosa, de color pardo grisáceo, con el umbón más oscuro y con el borde estriado por transparencia y con una fina tonalidad amarillenta para volverse una línea pardusca al secarse.

Láminas medianamente apretadas (en número mayor de 20), con lamélulas intercaladas (l=1-3), ascendentes, adnatas y algo excedentes del sombrero, de color blanco grisáceo.

Pie entre 2-3,5 x 0,1-0,15 cm, cilíndrico a curvado, de lleno a hueco, de color pardo grisáceo, enteramente pruinoso con la base con tonalidades azul verdosas.

Carne exigua, insignificante, con olor y sabor poco remarcado.


Esporada blanca

Suele habitar en madera y sobre todo en los conos o piñas, en este caso de *Pinus pinea*, o en el suelo entre residuos leñosos, bien solitariamente o en grupo reducido de pocos ejemplares, en temporada otoñal y primaveral y excepcionalmente a principios de invierno.



## MICRO

Esporas de 7-10x4,5-6 micras,elípticas,hialinas,algunas con gútula central,amiloides. Basidios de hasta 26 x 8 micras,tetraspóricos y claviformes. Queilos de cilíndricos a subfusiformes, algunos de ellos estrangulados y con base atenuada., hasta 50x7 micras. Pleuros no observados. Caulos cilíndricos, oblicuos. Epicutis en ixocutis formada por elementos cilíndricos paralelos con anchura de hasta 4 micras.



## OBSERVACIONES

Muy parecida es la *Mycena cyanorrhiza* Quél., algo más pequeña , con las láminas más separadas, y diferente morfología micro en lo que respecta sobre todo a los cistidios tanto de la arista laminar como del pie.