

## *Plicaria endocarpoides* (Berk.) Rifai

### MACRO

Ascocarpo entre 2 y 3,5 cm, de diámetro, sésil, en forma de copa al principio para ir aplanándose con la edad. Cara interna lisa, apenas vesiculosa de color pardo oscuro con el margen finamente resquebrajado. Cara externa con pequeñas y escasas pustulillas cerca del margen ,concolor o más pálido (pardo ocre) que la parte himenial y ligeramente furfuráceo cerca de la base. Carne consistente, no frágil incluso algo elástica. Olor y sabor inapreciables. Aparece aislado o en pequeños grupos en carboneras, en este caso sobre restos de una hoguera en zona de *Pinus pinea*.

### MICRO

Ascosporas globosas, entre 8 y 9 micras, lisas, hialinas.

Ascas menores de 230 micras,amiloides, octospóricas y pleurorrinca.

Parafisos filiformes de rectos a curvados con el ápice engrosado o capitado menor de 7 micras.

Excípulo ectal de estructuras globosas.

### OBSERVACIONES

Existen otras *Plicarias* parecidas pero tienen la espora ornamentada. También son parecidas la *Marcelleina personii* más pequeña y con esporas verrucosas y la *M. atroviolacea* (*Pulparia planchonis*) también más pequeña y de ambiente no carbonícola. *Peziza violacea* tiene las esporas elipsoidales. Su hábitat , su forma esporal y la terminación de los parafisos la hacen inconfundible.



Legit: L.A. Dterm.L.A. Lugar y fecha: Cubo del Vino (Zamora) zona quemada de *P.pinea* .24.12.12